

HERBICIDA
DAKOCLAN 48 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.631

DAKOCLAN 48 EC, es un Herbicida de Pre-emergencia y Post-trasplante que controla las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

* Clomazona	48% p/v (480 g/L)
Coformulantes c.s.p	100% p/v (1L)
*2-(2-clorobencil)-4-4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:


ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago

Lote N° :
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China
ZIP: 324400

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DAKOCLAN 48 EC, herbicida, cuyo ingrediente activo Clomazona pertenece al grupo químico de las isoxazolidinonas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable. Usar protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

DAKOCLAN 48 EC, es ligeramente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves y microcrustáceos acuáticos. Virtualmente no tóxico para abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

Instrucciones para el triple lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** lavar la zona contaminada con abundante agua de la llave. **En caso de contacto ocular:** lave inmediatamente los ojos con agua limpia, durante 15 minutos, y cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. **En caso de ingestión:** NO inducir el vómito. Trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano. **En todos los casos** trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de Intoxicación: dolor abdominal, posibles vómitos y diarrea, dolor de cabeza, mareo, pérdida del apetito. Irritación de las vías respiratorias, dermal y ocular.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **DAKOCLAN 48 EC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

DAKOCLAN 48 EC, es un Herbicida de Pre-emergencia y Post-trasplante que controla malezas de hojas anchas y gramíneas en los cultivos detallados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Maleza	Dosis L/ha	Observaciones
Arroz	Hualcacho, Pasto de la perdiz, Hualtata	0,8 – 1,0	Aplicar con maleza pequeña. En Hualcacho de 1-3 hojas.
Raps	Mostacilla Calabacillo Pasto pinito	0,250	Aplicar en preemergencia
Zapallo de guarda Zapallo italiano	Pata de gallina Hualcacho	1,5 – 1,8	Aplicar de pre-plantación incorporado y en preemergencia de las malezas. Volumen de agua sugerido 400 L/ha
Pepino	Pega-pega	0,8 – 1,0	
Melón tuna	Maicillo de semilla	0,8 – 0,9	
Melón reticulado Sandía	Sanguinaria Duraznillo Porotillo	0,5 – 0,7	
	Hierba de la culebra Hierba del chancho Verdolaga Enredadera Lengua de gato Mostacilla, yuyo, rábano Chamico		

Aplicar como máximo 1 vez por temporada

Instrucciones de uso:

- No aplicar el herbicida a través de sistemas de riego tecnificado ni en forma aérea.
- No aplicar en suelos secos.
- No aplicar en suelos muy livianos o arenosos con más de 80% de arena.
- Usar dosis mayor con malezas de 2 a 3 hojas y dosis menor con malezas recién emergidas.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora. usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 28°C.
- Volumen de agua sugerido 200 a 400 L/ha.

Consideraciones rotacionales: Una vez que se aplicó **Dakoclan 48 EC**, se debe esperar 12 meses para la siembra o plantación de hortalizas y 6 meses para solanáceas, como pimentón y tomate.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la dosis recomendada de **DAKOCLAN 48 EC**, y completar hasta el volumen deseado, manteniendo siempre agitación constante.

Incompatibilidad: Es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 11 o menores a 3. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos en que se recomienda, si se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Carencias: No corresponden por época de aplicación.



CUIDADO

