

FUNGICIDA
KRESICLAN 50 SC
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.885

KRESICLAN 50 SC, funguicida con acción de contacto, indicado para el control de hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Kresoxim-metilo (*)	50% p/v (500 g/l)
Cofulantes, c.s.p.	100% p/v (1 l)
(*) (E)-metoxiimino[2-(o-toliloximetil)fenil]acetato de metilo	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

KRESICLAN 50 SC, es un funguicida cuyo ingrediente activo Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de los Oximinoacetatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

KRESICLAN 50 SC, es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos, aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para Triple Lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: Administrar alcohol etílico (CH₃-CH₂OH) al 5% iv. (2 a 3 litros en 12 a 18 horas). **Tratamiento médico de emergencia:** En caso de ingestión de una cantidad importante, diluya con mediana cantidad de agua, realice una aspiración nasogástrica y luego practique un lavado gástrico.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar en forma inmediata a un centro asistencial y llevar la etiqueta o envase del producto. **Síntomas posibles:** diarrea, acidosis.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfono de emergencia: (2) 2777 1994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 2486 9000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **KRESICLAN 50 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

KRESICLAN 50 SC, funguicida con acción de contacto, indicado para el control de sarna o venturia, botritis y oídio en manzano, peral, vides, tomate y ajo.

Instrucciones de uso:

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS (cc/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
MANZANO PERAL	Venturia Oídio	200	Aplicar desde inicio de floración hasta fruto formado, en forma preventiva, alternando con funguicidas de distinto modo de acción. Efectuar 1 o máximo 2 aplicaciones por temporada, de manera no consecutiva. Volumen de agua sugerido: 1500 L/ha.	10
VIDES	Oídio Botritis	200	Aplicar en forma preventiva cada 15 días, desde brote de 80 cm hasta cierre de racimos. Durante este período efectuar como máximo dos aplicaciones del fungicida. Volumen de agua sugerido: 1500 L/ha.	7
TOMATE	Oídio Botritis	200	Realizar las aplicaciones en forma preventiva, alternando con productos de diferente modo de acción. Realizar como máximo 5 aplicaciones por temporada Volumen de agua sugerido: 1000 L/ha.	1
AJO	Moho azul del ajo	20 cc/100 lt agua	Sumergir los dientes (semillas de ajo) por 6 horas en la suspensión y posteriormente sembrar.	N.C.

N.C.: No corresponde por momento de aplicación.

Aplicar 1 o máximo 2 veces por temporada de manera no consecutiva.

No aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.

Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.

No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla:

Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **KRESICLAN 50 SC**, luego completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad:

KRESICLAN 50 SC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Es incompatible con productos de pH alcalino.

Fitotoxicidad:

No presenta en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



CUIDADO

