

Etiqueta doble Deadline
Cebo 5K
Chile version P
última actualización: 14-01-16

medidas: 24 x 31 cm.
papel: Fasson
colores: 2/0

firma:



DEADLINE® CEBO

RATICIDA ANTICOAGULANTE

Cebo (RB)

Descripción: Raticida anticoagulante para control de roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) en actividades agrícolas y forestales.

Composición: Bromadiolona*..... 0.005 % p/p (0,05 g/Kg) (1,25 mg/sachet)
Coformulantes c.s.p.....100 % p/p (1 Kg) (25.000 mg = 1 sachet)

*3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxycumarina

Serie:

Vence:



Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Precauciones y advertencias

Debe ser empleado sólo por personas adultas y utilizando overol impermeables y guantes impermeables para evitar el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Grupo químico: Bromadiolona pertenece al grupo químico de la 4-Hidroxycumarina.

Síntomas de intoxicación: aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.

Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre.

Primeros auxilios: en caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua de la llave, que corra, porque promueve la descontaminación por arrastre. De presentarse algún tipo de molestia, recurrir a un médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. De persistir molestia, recurrir a un médico.

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y procurar atención médica de inmediato.

Por la naturaleza de la formulación de este producto no es probable la intoxicación por inhalación, sin embargo de ocurrir, se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.

Tratamiento médico de emergencia: concurra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta de éste producto.

Antídoto: vitamina K en dosis de 20 a 40 mg/kg de peso.

Toxicidad: este producto es moderadamente tóxico para el hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingesta. Tóxico para peces.

No elimine residuos en cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUÍDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Contenido neto:

5 Kg



CEBO RATICIDA

Autorización SAG N°: 1686 Cebo (RB)

Teléfonos de emergencia:

Convenio CITUC 2 - 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A. 2 - 2749 8540



CUIDADO



Deadline Cebo

Descripción:

Deadline actúa impidiendo la normal coagulación en los roedores, los que mueren luego de 3 a 7 días de consumirlo. Este raticida funciona con dosis única, por lo que basta una sola ingesta para que el roedor muera.

Instrucciones de Uso:

Cuadro de Instrucciones de Uso

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	25 g cada 3 a 5 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	25 a 50 g cada 5 a 10 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	25 a 50 g cada 5 a 10 metros

En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del nivel de infestación presente.

Instalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores.
Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

Deadline no requiere preparación, viene listo para su uso.

No es fitotóxico y no tiene períodos de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

Tiempo de reingreso: Debido a la naturaleza del producto y su formulación no existe un tiempo mínimo de reingreso.

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ÉSTE.

Contenido neto:

5 Kg




CEBO RATICIDA

Autorización SAG Nº: 1686 Cebo (RB)

Serie:

Vence:

Clase toxicológica: Clase IV, CUIDADO



CUIDADO

