

MYCOSTOP 24 EC

FUNGICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2458

MYCOSTOP 24 EC, fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante, especialmente recomendado para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

MYCOSTOP 24 EC, es rápidamente absorbido por el follaje, disminuyendo los riesgos de lavado por lluvias.

COMPOSICIÓN :

* Miclobutanilo	24 % p/v (240 g/l)
Cofulantes c.s.p	100 % p/v (1 l)
* (RS)-2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

Lampa, CHILE

HANGZHOU MARCH CHEMICALS Co.Ltd.

1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road

Hangzhou - CHINA

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)

Melchor Romero, La Plata

Provincia de Buenos Aires - Argentina

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MYCOSTOP 24 EC, fungicida sistémico, Miclobutanilo pertenece al grupo químico de los Triazoles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y preparación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa.

Información Ecotoxicológica: **MYCOSTOP 24 EC**, es ligeramente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones para el triple lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al terminar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático. **Primeros auxilios:** En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de inhalación: traslade al afectado al aire fresco, si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de ingestión: No provocar vómitos. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En todos los casos llamar a un médico y trasladar al paciente rápidamente al hospital más cercano, llevando en lo posible el envase o la etiqueta del producto.

Síntomas de intoxicación: Irritación dermal y ocular con posible congestión y edema. Irritación de nariz, garganta y de las vías respiratorias inferiores. En caso de ingestión se presentan vómitos, náuseas, dolor abdominal, mareo, confusión mental y debilidad muscular.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfono de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTRO QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **MYCOSTOP 24 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

MYCOSTOP 24 EC, fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante, especialmente recomendado para el control de Oídio en Vides de mesa y Viníferas, Tomate, Remolacha y Cucurbitáceas.

Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (cc/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (DIAS)
Vides	Oídio o Peste ceniza	10 – 12 cc/hL equivalente a 150 – 180 cc/ha	Aplicar con brotes desde 10-15 cm de largo y repetir en preflor y cuaja de frutos.	10
Tomate Pimiento Alcachofa	Oídio o Peste ceniza	120 – 200	Aplicar al observar síntomas de la enfermedad. Dosis en función del desarrollo del cultivo y nivel de infestación.	7
Remolacha	Oídio, Cenicilla o Peste Ceniza	200 – 250	Aplicar al inicio de síntomas de la enfermedad. Emplear cubrimiento mayor a 300 L agua/ha.	20
Cucurbitáceas: Melón, Sandía, Zapallo, Zapallito, Pepino de ensalada	Oídio, Peste ceniza o Mildió polvoroso	130 – 170	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Repetir al tratamiento cada 15-20 días.	20
Cereales: Trigo, Cebada, Avena.	Oídio, Cenicilla, Peste ceniza	200 – 250	Iniciar los tratamientos en forma preventiva, o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15-20 días.	20

Aplicar máximo 4 veces por temporada con un intervalo mínimo de 10 días.

Instrucciones de uso:

- Utilizar mojamientos de 200 a 400 L de agua/ ha en cultivos bajos y 1500 – 3000 L de agua/ha en vides, empleando equipos convencionales de aplicación.
- Intervalo mínimo de aplicación 10 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- No aplicar durante las horas de más calor (sobre 28 °C).
- Para mejorar la distribución y penetración en el follaje, se recomienda mezclar con surfactante o aceite ULTRASPRAY

Preparación de la mezcla:

Llenar el equipo de aplicación hasta la mitad con agua. Luego agregar la dosis requerida de MYCOSTOP 24 EC, agitando permanentemente la mezcla y completar el volumen o capacidad del estanque, siempre con el agitador en marcha, para asegurar una buena homogeneidad de la mezcla.

Fitotoxicidad: No presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda, si se cumplen fielmente las instrucciones de uso de la etiqueta

Incompatibilidad:

Es incompatible con Polisulfuro de calcio, productos alcalinos y cúpricos. En caso de dudas realizar pruebas de compatibilidad.

Compatibilidad: MYCOSTOP 24 EC es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso corriente.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado para personas sin equipo de protección y animales.



CUIDADO

