

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Oxifluorfen, pertenece al grupo químico Difenil Eteres. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse profusamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de Intoxicación: dolor de cabeza, náuseas, embotamiento de los sentidos, somnolencia, irritación de los ojos y garganta.

Primeros Auxilios: Contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. **ENMARK**® no diluido puede irritar los ojos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar a un médico. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Consultar al médico.

Inhalación: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica. **Ingestión:** No se debe provocar vómito. No administrar ninguna bebida si el paciente está inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: CAB de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico, seguido de administración de 1-3 g/ kg de carbón activado, suspendido en una solución de 15 a 30 g de Sulfato de Sodio en 500 cc de agua, usado como laxante. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos Ambientales: **ENMARK**® es tóxico para peces, no contamine cursos de agua. No tóxico para aves ni abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Para realizar triple lavado de los envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces. Posteriormente perfore el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centro de acopio autorizado.

Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000; CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800; CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 6300

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

ENMARK®

HERBICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Herbicida indicado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas que son problemas en frutales, viveros forestales y hortalizas, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

*Oxifluorfen..... 24% p/v (240 g/ L)

Coformulantes c.s.p..... 100% p/v (1 L)

*2-cloro- α - α -trifluoro-*p*-tolil 3-etoxi-4-nitrofenil éter.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3441.

**Lote N°: Ver envase
Fecha Vencimiento: Ver envase**

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido neto:

Importa y Distribuye:

Basf Chile S.A.

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: 22640 7000, Santiago, Chile

Fabricado por:

Adama Agan Ltd.

P.O.Box 262, Northern Industrial Zone

Ashdod 77102, Israel

Adama Andina B.V.

Sucursal Colombia

Calle 1C N° 7 - 53 Interior Zona Franca

Barranquilla, Colombia

INSTRUCCIONES DE USO

Cuadro de Instrucciones de Uso Aplicación Terrestre

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Cebolla de trasplante	Bledo, Verdolaga, Yuyo, Duraznillo, Quingüilla	1.0 - 1.5	Aplicar 15 a 20 días después del trasplante, sobre malezas de 3-4 cm de altura o 2 a 3 hojas verdaderas. Realizar solo una aplicación con estas dosis y en caso de requerir una segunda aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico. Mojamiento 200 L/ha.
Semilleros de Cebolla	Hualcacho, Pichoga	0.5 - 1.0	Aplicar post emergencia temprana de las malezas y del cultivo con 2 a 3 hojas como mínimo (+ 8 a 10 cm de altura). Realizar una aplicación. En caso de requerir una segunda aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico. Mojamiento 200 L/ha.
Ajo y Cebolla Picklera	Chamico, Malva, Rábano, Ortiga, Pata de Gallina, Pega-Pega	0.5 - 1.0	Aplicar de post emergencia, sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo y cultivo con 2 a 3 hojas como mínimo (+ 8 a 10 cm de altura). Realizar una aplicación. En caso de requerir una segunda aplicación consultar a nuestro Departamento Técnico. Mojamiento 200 L/ha.
Hortalizas de Trasplante: Brócoli, Coliflor, Repollo, Repollo Bruselas, Pimentón, Ají, Tomate		2.0 - 3.0	Aplicar con suelo regado y bien nivelado 1 a 2 días antes del trasplante en pre emergencia o post emergencia temprana en las malezas. No aplique sobre el cultivo después del trasplante. Mojamiento 200 L/ha. Realizar 1 aplicación.
Alcachofas		2.0 - 3.0	Aplicar antes o inmediatamente después del trasplante (1 día), sobre suelo húmedo y mullido. Utilizar un mojamiento de 200 a 300 L/ha. Realizar 1 aplicación.
Frutales: Parronales, Viñas, Kiwis, Manzano, Peral, Membrillero, Duraznero, Nectarino, Damasco, Nogal, Ciruelo, Cerezo, Almendro, Palto, Olivos. Berries: Frambueso, Arándano, Mora, Zarzaparrilla. Citricos: Limonero, Naranja, Clementino, Mandarino, Pomelo, Tangelo		2.0 - 3.0	Aplicar en invierno en pre y/o post emergencia temprana de las malezas, sobre suelo mullido y húmedo. Aplicar desde caída de hojas y hasta 15 días antes de brotación. ENMARK ® puede ser utilizado desde el 1er año de plantación tomando la precaución de no aplicar mas de 2.0 L/ha y no mojar el tronco poco lignificado del frutal durante los dos primeros años. Realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 40-60 días. Utilizar un mojamiento de 200 L/ha.
Viveros forestales: Eucaliptus, Pino		1.0 - 2.0	Aplicar después de la siembra, en pre emergencia temprana o en post emergencia de las plantas de pino y eucaliptus, después de 5 semanas de emergidas. Mojamiento de 200 L/ha. Realizar una aplicación por temporada.
Plantaciones forestales: Eucaliptus, Pino		3.0 - 4.0	Aplicar en invierno, antes o después del trasplante, sobre suelo sin malezas o recién emergidas. Mojamiento de 200 L/ha. Realizar una aplicación por temporada.

Nota: El nivel de la dosis a usar (mayor o menor) estará dado en función de los cultivos y especies de malezas a tratar, ubicación regional, época del año y el clima. En los casos de post emergencia, utilizar la dosis mayor. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento superior a 8 km/hr., no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el estanque con agua hasta la mitad, agregar la cantidad requerida de **ENMARK**® diluido previamente en un poco de agua y complete el volumen total con agitación constante. En caso de mezclas, los productos deben adicionarse por separado.

FITOTOXICIDAD: **ENMARK**® no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las recomendaciones adecuadamente. Aún así, puede ser fitotóxico en cebollas cuando es aplicado en plantas muy pequeñas, que aún no enderezan la hoja bandera y con menos de 2 hojas verdaderas, y en plantas de pino recién emergidas (antes de 5 semanas). En frutales y vides no aplicar **ENMARK**® sobre follaje verde, ni tampoco durante o después de la brotación (aplicar sólo hasta 15 días antes de brotación). En cebollas y ajos no aplicar en mezcla con surfactantes o adherentes.

COMPATIBILIDAD: **ENMARK**® es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso corriente, como Glifosato, Paraquat, Simazina, Pendimetalina, Aceite Mineral miscible, Adherentes y Reguladores de pH, ateniéndose a las restricciones propias de estos productos.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con compuestos alcalinos y oxidantes.

PERÍODO DE CARENIA: No se considera para frutales ni los demás cultivos, debido a la naturaleza de su aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO: En el caso de personas, se recomienda esperar al menos 24 horas para reingresar al área tratada después de realizada la aplicación. El período de resguardo propuesto para el ingreso de animales a los sectores tratados es de 1 día.



CUIDADO

