

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Linuron, ingrediente activo de **LINUREX® 50 SC**, pertenece al grupo de las Ureas. A pesar de ser ligeramente tóxico, considera las normas de seguridad para el personal encargado de la aplicación respecto al equipo apropiado y completo. No aplicar con viento. No aspirar o exponerse en el estanque de la mezcla. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. **Durante la preparación** utilice equipo de protección adecuado: guantes y botas de goma, delantal impermeable y protector facial. **Durante la aplicación** del producto utilice guantes y botas de goma, overol impermeable y protector facial. Al aplicar **LINUREX® 50 SC** de post-emergencia, asegurarse previamente, que todas las partes del equipo pulverizador estén limpias y libres de residuos de herbicidas a base de 2,4-D y MCPA, porque estos productos dañan casi todos los cultivos de hoja ancha que toleran **LINUREX® 50 SC**. Lávese el equipo pulverizador completo con una solución al 10% de amoníaco o detergente para lavar y enseguida enjuague con abundante agua. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No se conocen Síntomas de Intoxicación en humanos. En las ratas los síntomas de intoxicación son: pasividad, perturbaciones del equilibrio, respiración retardada, disminución de la temperatura y los reflejos. **TRATAMIENTO DE EMERGENCIA:** En caso de ingestión, considerar lavado gástrico, tomando precauciones para evitar la aspiración. Tratar sintomáticamente. **PRIMEROS AUXILIOS:** En contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En contacto con la piel, lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si el producto ha sido inhalado, traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Si el producto es ingerido, NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. En todos los casos anteriores, llevar inmediatamente al afectado a un centro asistencial, presentando esta etiqueta al profesional de la salud a cargo. **ANTIDOTO:** No se conoce antídoto específico, aplicar tratamiento base. **ECOTOXICIDAD:** **LINUREX® 50 SC** es tóxico para organismos acuáticos y peces, levemente tóxico en aves y no tóxico a abejas.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA.

Instrucciones para el Triple Lavado: Para realizar triple lavado de envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces. Perforar envases.

En caso de INTOXICACIÓN, llamar al fono: 22635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 horas, convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es: 22855 0048.

Conservar el producto en sus envases originales, bien cerrados y en un lugar bajo llave. Los envases vacíos y perforados, eliminados lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad competente.

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

LINUREX® 50 SC

HERBICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

LINUREX® 50 SC, es un herbicida sistémico, selectivo líquido para combatir malezas anuales de hoja ancha y angosta, las cuales se indican en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

*Linuron..... 50% p/v (500 g/L)

Cofomulantes, c.s.p..... 100% p/v (1 L)

*3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-metilurea

Lote N°: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3253

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Contenido Neto:

Importa y Distribuye:
Adama Chile S.A.
Camino Catemito 2800, Lote A2
Santa Gabriela, Calera de Tango
Santiago - Chile

Fabricado por:
Adama Agan Ltd.
P.O.Box 262, Northern Industrial Zone
Ashdod 77102
Israel

Adama Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N°7-53 Interior Zona Franca
Barranquilla, Colombia

LINUREX® 50 SC es marca registrada de AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS

INSTRUCCIONES DE USO

LINUREX® 50 SC, es un herbicida sistémico y selectivo, el cual penetra a las malezas a través de hojas y raíces, actuando en la zona de germinación de las malezas, durante 1 hasta 4 meses de acuerdo a la dosis aplicada, textura y materia orgánica del suelo. Las malezas controladas por **LINUREX® 50 SC**, se indican en el cuadro de instrucciones de uso del producto.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	MALEZAS	DOSES (L/ha)	OBSERVACIONES
Ajo	Alfilerillo, Bledo, Cebadilla, Duraznillo, Hualcacho, Linacilla, Llantén, Malvilla, Mastuerzo, Mostaza, Nihue, Ortiga,	1,2 - 1,5	Aplicar en post-emergencia a malezas de 2 a 4 hojas y Ajos de 10 cms, de altura, aplicar en lo posible después de una lluvia o un riego. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Apio	Pasta blanco, Pata de gallina,	1,5 - 2,5	Aplicar después de un riego, 10 a 20 días después de plantar. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Arveja	Pega-pega, Pichoga, Piojillo, Quillay-quillay, Quingüilla,	1,0 - 2,0	Efectuar una sola aplicación después de la siembra, en pre-emergencia. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Cebolla	Rábano, Romaza, Verdolaga, Vinagrillo, Yuyo, Paco yuyo, Ambrosia, Falaris, Tomatillo, Sanguinaria, Bolsita del pastor, Ballica anual, Manzanilla.	0,8 - 1,0	Aplicar 10 a 20 días después de la siembra y después de un riego de manera muy uniforme. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Cebada		1,5 - 2,0	En pre emergencia aplicar inmediatamente después de la siembra. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Espárragos		1,0 - 1,5	En post emergencia, aplicar en plantas con 3 a 4 hojas, antes de la macolla. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Maravilla		1,5 - 2,0	Aplicar en pre-emergencia a partir del 3er año de plantación. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Gladiolos		2,0 - 2,5	Aplicar en pre-emergencia, usando dosis mínimas en suelos livianos y máximas en suelos pesados. Aplicar inmediatamente después de la siembra. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Habas		1,0 - 1,5	Aplicar inmediatamente antes de la emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Lentejas		1,0 - 2,0	Aplicar un día después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Lupino		1,0 - 1,5	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Manzano, Peral, Membrillo, Kiwi, Duraznero, Nectarino, Damasco, Cusub, Cerezo, Almenro, Nogal, Vides.		2,0 - 2,5	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Papas		5,0 - 6,0	Aplicar el producto a partir del 3er año de plantación, con pulverización dirigida después de desmalezar mecánicamente en Agosto-Septiembre. Efectuar una sola aplicación en la temporada. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Perejil, Cilantro.		1,5 - 3,0	Aplicar en emergencia después de la siembra, aporcar y aplicar alrededor de 5 días antes que emerjan. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Porotos		1,0 - 2,0	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Trigo primavera (no asociado)		1,0 - 2,0	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Zanahoria		1,5 - 2,0	Efectuar una sola aplicación en pre-emergencia, aplicar 2 a 4 días después de la siembra. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
		1,0 - 1,2	En post-emergencia, aplicar cuando las plantas tengan 3 a 6 hojas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
		2,0 - 3,0	En pre-emergencia, aplicar después de la siembra y un riego. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
		1,5 - 2,5	En post-emergencia, aplicar con 3 hojas verdaderas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN AÉREA

Trigo primavera	Alfilerillo, Bledo, Cebadilla, Duraznillo, Hualcacho, Linacilla, Llantén, Malvilla, Mastuerzo, Mostaza, Nihue, Ortiga, Pasta blanco, Pata de gallina, Pega-pega, Pichoga, Piojillo, Quillay-quillay, Quingüilla, Rábano, Romaza, Verdolaga, Vinagrillo, Yuyo, Paco yuyo, Ambrosia, Falaris, Tomatillo, Sanguinaria, Bolsita del pastor, Ballica anual, Manzanilla.	1,5 - 2,0	Efectuar una sola aplicación en pre-emergencia, aplicar con 2 a 4 días después de la siembra, con un mojamiento de 40 L/há. de agua.
-----------------	--	-----------	--

Nota: La dosis mínima se comprende para suelos livianos arenosos y la máxima para suelos pesados arcillosos en aplicación pre-emergente. En la aplicación post-emergente se calcula la dosis de acuerdo con el tamaño y vigor de las malezas y tolerancia del cultivo. Si se mezcla con otro herbicida para ampliar su espectro de acción, debe consultarse a nuestro Departamento Técnico. En aplicaciones de post-emergencia, productos como el 2,4-D y MCPA pueden dañar cultivos de hoja ancha que si toleran **LINUREX® 50 SC**. No aplicar en suelos arenosos con menos de 1% de materia orgánica. Deben evitarse dosis excesivas o repeticiones en el sector aplicado, ya que es posible que se produzcan daños en cultivos menos tolerantes (cebollas, ajos). Intensas y prolongadas lluvias, después de la aplicación de **LINUREX® 50 SC**, pueden causar daños al cultivo. Por lo tanto, no aplicar si se prevén condiciones de alta pluviometría próximas a la aplicación. En la aplicación pre-emergente al cultivo, hay que procurar una buena cama de semilla, bien preparada, sembrar uniformemente a profundidad conveniente (mínima de 5 a 7 cms, dependiendo del tamaño de la semilla). Al momento de la aplicación, el suelo debe presentar cierto grado de humedad. Después de la aplicación, y mientras no aparezcan malezas, evitar mover el suelo con trabajos culturales para no destruir la capa de **LINUREX® 50 SC** en la superficie tratada, lo cual disminuirá el efecto residual del herbicida. **PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Hacer pre-mezcla de la dosis indicada de **LINUREX® 50 SC** en un balde de agua y agitar, vierta la pre-mezcla al estanque con agua hasta la mitad, manteniendo el agitador en marcha, luego agregar el agua faltante. **FITOTOXICIDAD:** **LINUREX® 50 SC** no presenta fitotoxicidad a los cultivos indicados si se utiliza siguiendo estrictamente las recomendaciones de esta etiqueta. Puede existir sensibilidad varietal para los distintos cultivos, por lo que se recomienda realizar pruebas previas en caso de dudas. **COMPATIBILIDAD:** **LINUREX® 50 SC** es compatible en mezcla de estanque con otros herbicidas, como por ejemplo: Atrazina, 2,4-D como sal (2,4-D-Trisopropanolamónio); 2,4-D-Dimetilamónio) y con surfactantes no iónicos. **INCOMPATIBILIDAD:** **LINUREX® 50 SC**, es incompatible con productos fuertemente alcalinos. No se recomienda mezclar con fungicidas o insecticidas. **Período de Carenza:** Por su época de uso no corresponde. **Tiempo de Reingreso al Área Tratada:** No reingresar al área tratada antes de 4 horas de aplicado el producto. El período de resguardo propuesto para el reingreso de animales a los sectores tratados es de 30 días.



CUIDADO

