

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

CYCLON® WP, fungicida, Miclobutanilo pertenece al grupo químico de los Triazoles y Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilbenzimidazolcarbamatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, mascarilla con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación bañarse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información Ecotoxicológica: **CYCLON® WP**, es moderadamente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Muy tóxico para algas. Virtualmente no tóxico para abejas y Prácticamente no tóxico para aves.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Síntomas de Intoxicación:** Se puede observar anorexia, hiperexcitabilidad, hipotermia, convulsiones, vómitos persistentes con diarrea, con alteración de los electrolitos y además una posible hipovolemia. **Primeros auxilios:** **En caso de contacto con la piel:** lavar la zona contaminada con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto con los ojos:** lavar los ojos con abundante agua corriente y fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **CYCLON® WP** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada por ANASAC

CYCLON® WP

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2646.

CYCLON® WP, fungicida de acción preventiva y curativa interfiere con la biosíntesis del ergosterol en los hongos, recomendado especialmente para el control de Venturia en Manzanos. La mezcla de sus dos ingrediente activos permite un manejo flexible y completo, tanto preventivo como curativo de Venturia.

COMPOSICION :

* Miclobutanilo	1,4% p/p (14 g/kg)
** Mancozeb	65% p/p (650 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100 % p/p (1 kg)
*(RS)-2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo	
** Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cincúica	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:
Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa, CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China
ZIP: 324400



NTA New Tech Agro
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

CYCLON® WP, fungicida de acción preventiva y curativa interfiere con la biosíntesis del ergosterol en los hongos, recomendado especialmente para el control de Venturia en Manzanos. La mezcla de sus dos ingrediente activos permite un manejo flexible y completo, tanto preventivo como curativo, de Venturia y es una herramienta para prevenir el desarrollo de cepas resistentes.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Manzano	Venturia del manzano.	4 – 6	Aplicar preventivamente entre puntas verdes y botón rosado o curativamente si se producen condiciones para la infección. Posteriormente aplicar cuando se prevean o se produzcan condiciones para la infección. Utilizar cubrimientos de 1500 – 2500 Lts / ha Aplicar no mas de 4 veces por temporada, repetir cada 7 días como mínimo.	15

Observaciones

- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta ¾ partes, luego agregar **CYCLON® WP** con agitación constante hasta completar el volumen total. Es preciso que el equipo aplicador cuente con agitador mecánico.

Compatibilidad: **CYCLON® WP**, Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Incompatibilidad: **CYCLON® WP** es incompatible con productos alcalinos y cúpricos. No mezclar con clorpirifos.

Fitotoxicidad: **CYCLON® WP**, no es fitotóxico si es utilizado en las dosis y usos recomendados.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas luego de la aplicación sin equipo de protección personal. No corresponde reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

