

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- * Lorox WP pertenece al grupo químico de las ureas.
- * No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- * Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco, exclusivo para productos fitosanitarios.
- * Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo de su uso para otros fines.
- * Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- * Durante la preparación del producto usar guantes de goma, botas de goma, protector facial, delantal impermeable, y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- * Durante la aplicación del producto usar guantes de goma, botas de goma, protector facial, delantal impermeable, y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- * Aleje a los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- * No aplique directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- * Después del trabajo, cambie y lave la ropa de trabajo.
- * Lávese prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de piel, ojos y mucosas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si persiste la irritación acudir al médico (oftalmólogo).
- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si persiste la irritación o dolor acudir al médico.
- **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco y buscar ayuda médica. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
- **Ingestión:** No provocar el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar al médico inmediatamente.

TRATAMIENTO MÉDICO: En caso de ingestión, considerar lavado gástrico, toma de todas las precauciones para evitar la aspiración. Tratar sintomáticamente.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

RIESGOS AMBIENTALES: Lorox WP es tóxico para organismos acuáticos, leve mente tóxico en aves y no tóxico a abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA DEL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. UTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DEACUORDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIER OTROS QUE ESTÁN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR A REÁRTRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de emergencia:
 Kerley Latinoamericana Ltda.: (2) 2820-4261
 CITUC (Convenio CITUC / AFIPA): (2) 2635-3800
 RITA-CHILE: (2) 2861-9414 / (2) 2777-1994
 CITUC QUÍMICO (Emergencia química): (2) 2247-3600

En caso de INTOXICACIÓN
 llamar al
26353800
 SANTIAGO
Atención las 24 horas
 CONVENIO CITUC Y AFIPA

Fabricado por:
 Agan Chemical Manufacturers Ltd. P.O.
 Box 262 Ashdod 77102 Israel

Importado y Distribuido por:
Kerley Latinoamericana Ltda.
 Av. Vitacura 2670 Of. 1501 Piso 15,
 Las Condes Santiago- Chile

Lorox® WP

Herbicida Polvo Mojable (WP)

Herbicida selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en hortalizas y otros cultivos.

Composición:

- * Linurón.....50% p/p (500 g/Kg)
 - Cofomulantes c.s.p.c.....100% p/p (1 Kg)
- *3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1metilurea.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3482

PRODUCTO NO INFLAMABLE, NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO

Lote:

Fecha de vencimiento:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO:

Lorox WP es un herbicida selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en hortalizas y otros cultivos. No controla las siguientes malezas: avenilla, clonqui, suspiro, malva, arvejilla y malezas perennes como correhuela, chéptica, maicillo, coquillo o chufa.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Ajo	Hoja ancha y Gramíneas	1,2 - 1,5	Realizar 1 aplicación cuando el ajo tenga 10 cm de altura y malezas con 2-4 hojas después de un riego o lluvia. No mezclar con surfactantes ni adherentes. Mojamiento: 300-400 L/ha.
Arvejas, Lentejas	Pre-emergencia:	1,0 - 2,0	Realizar 1 aplicación inmediatamente después de la siembra, sobre suelo mullido y húmedo. Mojamiento: 400-600 L/ha.
Apio	quilloi-quilloi, verdolaga, pacoyuyo, quingüilla, mostaza, bledo, rábano, ambrosia, duraznillo, huacalacho, falaris, pala de gallina, pega-pega, tomatillo, sanguinaria, yuyo, bolsita de pastor, ballica anual, manzanilla, ortiga, ailamisa.	1,5 - 2,5	Realizar 1 aplicación 10-20 días después de la plantación, después de un riego, antes que el apio tenga 20 cm de altura y las malezas 5 a 10 cm. No aplicar con temperaturas sobre 28°C o en mezclas con surfactantes, soluciones de nitrógeno u otro producto fitosanitario. No replantar con otros cultivos que no sean apio o zanahoria, dentro de los 4 meses siguientes a la aplicación. Mojamiento: 300-400 L/ha.
Cebolla		0,8 - 1,0	Realizar 1 aplicación 15-20 días después de la plantación, después de un riego. Mojamiento: 300-400 L/ha. Puede provocar fitotoxicidad en cebolla blanca (variedad para deshidratado). No mezclar con surfactantes.
Espárragos (siembra directa)		1,0 - 2,0	Realizar 1 a 2 aplicaciones de post-emergencia con intervalos de 25 días, cuando el follaje tenga 15-45 cms de altura y las malezas no más de 10 cm. No aplique más de 4 kg por temporada. Mojamiento: 200-300 L/ha.
Espárragos establecidos	Post-emergencia:	2,0 - 4,0 1,0 - 2,0	Realizar 1 aplicación de 2 a 4 Kg/ha en pre-emergencia y realizar 1 a 4 aplicaciones de 1 a 2 kg/ha en post-emergencia con intervalos de 25 días, antes que las malezas alcancen 10 cm de altura. Aplique antes de la temporada cosecha o inmediatamente después. Mojamiento: 200-300 L/ha.
Lupino	(plántulas), ambrosia, Amsinckia spp, verdolaga, senecio anual, Scleranthus annuus, quingüilla, mostaza, bledo, enredadera, ballica anual, huacalacho, falaris, pala de gallina, pega-pega, festuca, ailamisa.	2,0 - 2,5	Realizar 1 aplicación inmediatamente después de la siembra, sobre suelo mullido y húmedo. Mojamiento: 400-600 L/ha.
Maravilla		2,0 - 2,5	Realizar 1 aplicación sólo sobre suelo mullido y húmedo, inmediatamente después de la siembra. Mojamiento: 400-600 L/ha.
Papas		1,5 - 3,0	Realizar 1 sola aplicación después de la apora, antes que los brotes de la papa emerjan, sobre suelo húmedo. Mojamiento: 200-400 L/ha.
Zanahoria		2,0 - 3,0	Realizar 1 aplicación inmediatamente después de la siembra (semilla debe ser sembrada por lo menos a 1,25 cm de profundidad), o cuando las malezas tengan 2-3 hojas y la zanahoria sobre 7,5 cm de altura, sobre suelo húmedo. Emplear dosis menores en aplicaciones de post-emergencia. No mezclar con surfactantes ni soluciones de nitrógeno u otro producto fitosanitario. No aplicar con temperaturas sobre 28°C. Mojamiento: 300-400 L/ha.

(*) Emplear las dosis menores en suelos livianos y la dosis mayor en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica. No aplicar en suelos arenosos o con menos de 1% de materia orgánica.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Emplear equipo con agitador. Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Hacer funcionar el agitador. Agregue la cantidad necesaria de producto previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Lorox WP no presenta fitotoxicidad si se utiliza siguiendo estrictamente las recomendaciones de esta etiqueta. No aplicar en orgéano.

COMPATIBILIDAD: Lorox WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. **INCOMPATIBILIDAD:** Lorox WP es incompatible con productos de reacción alcalina. No se recomienda mezclar con funguicidas o insecticidas, surfactantes, adherentes, ni soluciones de nitrógeno.

PERIODOS DE CARENIA: No corresponde por los momentos de aplicación.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda una espera de 6 horas para el ingreso al área tratada.

Nota: Si es necesario resembrar o replantar en suelos tratados de pre-emergencia con Lorox WP puede resembrarse con el mismo cultivo, previo un completo trabajo de suelo, sin repetir la aplicación de Lorox WP a menos que se indique lo contrario.



CUIDADO

