

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**GRUPO QUÍMICO:** Fungicida biológico en base a esporas de la Cepa C55 de la bacteria *Bacillus subtilis*. Seguir las precauciones habituales en el manejo de fitosanitarios. **Para su seguridad durante la preparación:** Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión e inhalación. Use guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, máscara con filtro y antiparras; aleje animales domésticos y personas extrañas. **Para su seguridad durante la aplicación:** Use guantes impermeables, botas de goma, overol, máscara con filtro y antiparras. Lávese después del trabajo y antes de comer, Cambiarse y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No hay antecedentes de intoxicación asociados a *Bacillus subtilis*.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **1.- En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **2.- En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **3.- En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **4.- En caso de Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

**ANTÍDOTO:** No posee, tratar sintomáticamente.

**TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:** Ante cualquier síntoma de molestia, acudir a un centro de salud y atención especializado

**ECOTOXICIDAD:** No es tóxico para aves, peces y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS** • EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD • REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMOS HUMANO O ANIMAL • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA • NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO • LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: RITA: (56) 22 777 1994 BIOPACIFIC: (56) 22 526 5228**

**Precauciones de Almacenaje:** El almacenamiento debe ser en un lugar fresco, seco y la sombra; separado de semillas, forrajes y fertilizantes; siempre conservando el producto en su envase original, bien cerrado hasta 2 años desde la fecha de envasado. No debe exponerse al sol ni a las altas temperaturas.

**Instrucciones para el Triple Lavado:** Vacíe el envase en el estanque pulverizador y mantengalo en posición de descarga 30 segundos; a continuación agregue agua hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua del envase en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Repita el proceso 3 veces. Finalmente perfere el envase para evitar su reutilización.



# BACIFORTE

## BACTERICIDA BIOLÓGICO SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.956-O

**BACIFORTE®** es un bactericida biológico preventivo en base a una cepa nativa de *Bacillus subtilis*. **BACIFORTE®** coloniza rápidamente los nichos ecológicos y microheridas en la planta compitiendo con las bacterias fitopatógenas. Además, contiene metabolitos secundarios con acción biocontroladora, que inhiben el desarrollo de las enfermedades en las plantas.

### COMPOSICIÓN

*Bacillus subtilis* cepa C55\* 0,1% p/v (1 g/L)  
Coformulantes c.s.p 100% p/v (1 L)

\*Contiene 1x10<sup>9</sup> UFC/ml

### << LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:  
Contenido Neto: 1L  
Fecha fabricación: Ver información en el envase.

DISTRIBUIDO POR:



ANASAC CHILE S.A.  
Almirante Pastene 300  
Providencia  
Santiago, Chile  
www.anasac.cl

FABRICADO POR:



TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA AGRICULTURA  
BioPacific SPA  
Santa Elvira 030, Nuiñoa,  
Santiago, Chile  
Teléfono +56 2 2526 5228  
www.biopacific.cl

**NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO "AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL"

Baciforte® es un biocontrolador preventivo, recomendado contra enfermedades provocadas por *Pseudomonas syringae*

### Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Tomate	Peca bacteriana <i>Pseudomonas syringae</i> pv. tomat	300-500 ml/100 L de agua	Aplique preventivamente realizando un mojiamento completo de la planta, desde trasplante a floración cada 7 días y a continuación de cualquier labor que genere heridas (desbrote, amarre, desputte, etc). Aplicar la dosis máxima si observa focos de la enfermedad. Se recomienda un mojiamento de 300-1200 litros según estado fenológico o labores que generen heridas en el cultivo.
Cerezo, Damascos, Durazneros, Nectarinos, Plumcot.	Cáncer bacterial <i>Pseudomonas syringae</i> pv. syringae	100-150 cc/hL	Realizar hasta 4 aplicaciones por temporada. 3 aplicaciones en caída de hojas y 1 aplicación en inicio de floración, con mojiamento de 1000 a 1500 L/Ha. Utilizar la dosis mayor, ante una alta presión de la enfermedad.

Mojiamento asegurando un buen cubrimiento.

**Aplicación:** Previo a la aplicación, diluir el producto con agua en un recipiente agitando vigorosamente hasta alcanzar un líquido homogéneo e incorporar en el estanque del equipo de aplicación. Realizar la aplicación de preferencia temprano en la mañana o al atardecer.

**Incompatibilidad:** Incompatible con plaguicidas en base a bactericidas. Baciforte® presenta una alta compatibilidad con la mayoría de los productos agrícolas del mercado. No obstante, CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR antes de llevar a cabo una aplicación conjunta con otros productos.

**Fitotoxicidad:** no presenta fitotoxicidad en el cultivo recomendado.

**Período de carencia (días):** No tiene carencia

**Tiempo de reingreso al área tratada:** Para personas es posible reingresar cuando el producto se ha secado. Para animales no corresponde, ya que los cultivos no son de consumo animal.



# CUIDADO