

Santiago, 06 de septiembre de 2021

SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida BIFENTRIN 100 EC, INGREDIENTE ACTIVO: BIFENTRIN, FORMULACIÓN: CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC), CONCENTRACIÓN: 10 % p/v, NUMERO DE AUTORIZACIÓN SAG 1834 para el control de *Lobesia botrana* en frutos de *Vaccinun corymbosum* en Chile.

NEWPAT CHEMICALS SPA certifica que es posible recomendar el uso de insecticida BIFENTRIN 100 EC, NÚMERO DE AUTORIZACIÓN SAG 1834 para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de arándano.

BIFENTRIN 100 EC para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado, 2 veces durante la temporada, desde caída de pétalos hasta precosecha, dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de BIFENTRIN 100 EC para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electrostática	Período de protección por aplicación (días)
Arándano	60	No se recomienda	No se recomienda	14

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de BIFENTRIN 100 EC: No aplicar con vientos excesivos (más de 8 km/hr), no aplicar con T° mayores a 25 °C o alta humedad ambiental, en caso de lluvia por sobre los 35 mm, repetir la aplicación.

BIFENTRIN 100 EC debe ser aplicado en el momento de máxima eclosión de huevos dirigiendo la aspersión a flores y racimos para el control de LARVAS de todos los estados de desarrollo.

Considerar que BIFENTRIN 100 EC es ligeramente tóxico a abejas y no se cuenta con antecedentes que midan la toxicidad en enemigos naturales

BIFENTRINA, ingrediente activo de BIFENTRIN 100 EC, actúa por contacto e ingestión, y su mecanismo de acción está clasificado como un piretroide – larvicida, que afecta el sistema nervioso central y causa parálisis en los insectos y ácaros

BIFENTRINA Tiene tolerancia en arándano en Chile según se indica en el cuadro siguiente:

Ingrediente activo	Arándano (ppm)	Período de Carencia (días)	Fuente
BIFENTRINA	1,8 ppm	1	Resolución Exenta N° 892 de 2020

Para Chile la carencia es de 1 día y el período de reingreso es de 24 horas.

Macarena Madariaga P
Gerente Asuntos Regulatorios
NEWPAT CHEMICALS SPA