

3919114

OF. DE PARTES CENTRAL	
Nº:	
22 ABR 2019	
A: <u>Agrícola</u>	
<input type="checkbox"/> CON ANT.	<input checked="" type="checkbox"/> SIN ANT.

Santiago, 15 de abril de 2019

SEÑOR:

RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO. -

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Sub-departamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida **QUILATE® 700 WP**, ingrediente activo es ACETAMIPRID (700 g/kg), número de autorización SAG 1.852, para el control de *Lobesia botrana* en frutos de *Vaccinium corymbosum* en Chile.

POINT CHILE S.A., certifica que es posible recomendar el uso del insecticida **QUILATE® 700 WP**, número de autorización SAG 1.852 para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de arándano.

QUILATE® 700 WP para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado hasta 1 vez durante la temporada, de acuerdo con el monitoreo de la plaga, desde brotación a precosecha, dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de **QUILATE® 700 WP** para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describen a continuación.

Especie	Concentración g/100 L Maquinaria convencional	Concentración g/100 L Maquinaria bajo volumen	Concentración g/100 L electrostática	Período de protección por aplicación (días)
Arándano	15	--	--	18

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de **QUILATE® 700 WP**: no aplicar con viento mayor a 8 km/hora ni con temperaturas mayores a 30° C. No aplicar si se pronostican lluvias dentro de 6 horas

INVICTO® 50 CS debe ser aplicado de acuerdo con el monitoreo de la plaga desde inicio de eclosión, en momento de máxima eclosión de huevos, dirigiendo la aspersión a flores y racimos para el control de huevos y larvas (L1 y L2).


Considerar que **QUILATE® 700 WP** presenta toxicidad media para abejas y enemigos naturales.

Acetamiprid, ingrediente activo de **QUILATE® 700 WP**, actúa por contacto, ingestión y su mecanismo de acción está clasificado como bloqueador de receptor nicotínico de la acetilcolinesterasa, neonicotinoide, grupo 4A (IARC).

QUILATE® 700 WP tiene tolerancia en arándano en Chile según se indica en cuadro siguiente:

Ingrediente activo	Tolerancia (ppm)	Período de carencia (días)	Fuente
Acetamiprid	0,01	30	Resolución N° 762/2011 de MINSAL

Para Chile el período de carencia es de 30 días y el período de reingreso es de 12 horas.


Juan Ignacio Reyes
Departamento Desarrollo Técnico
Point Chile S.A.