

HELVETICA - Cuerpo 7- 8

HELVETICA - Cuerpo 9

HELVETICA - Cuerpo 8

INSTRUCCIONES DE USO

PODASTIK® PLUS es un fungicida de acción fungistática, y se utiliza para el control preventivo de enfermedades causadas por hongos de la madera en los cultivos indicados en el Cuadro de instrucciones de uso. Estos hongos se caracterizan por penetrar a través de heridas y/o cortes de poda. Al pintar los cortes con **PODASTIK® PLUS** se evita la entrada de los hongos *Chondrostereum purpureum*, agente causal del plateado en Carozos: Durazneros, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Nectarinos, Almendros, Plumcots y Pomáceas: Manzanos, Peral y Peral Asiático, además de Vides y Kiwis. Así mismo con aplicaciones tópicas se previene el ataque de los hongos causantes del enrollamiento clorótico de la Vid (Uva de Mesa, Parronales y Viñas) y del Cancro Europeo del Manzano, tal como se indica en el Cuadro de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

FRUTALES	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Carozos: Durazneros, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Nectarinos, Almendros y Plum Cot. Pomáceas: Manzanos, Peral y Peral Asiático. Kiwis.	Plateado (<i>Chondrostereum purpureum</i>)	Pintar con PODASTIK® PLUS directamente sobre el corte de poda o herida.	PODASTIK® PLUS se debe aplicar inmediatamente después de efectuado el corte, cubriéndolo completamente. Una aplicación por temporada, luego del corte.
Uva de Mesa, Parronales, Viñas y Kiwis.	Enrollamiento Clorótico (<i>Fomitiporella vitis</i>)		
Manzanos	Cancro Europeo o Nectria. (<i>Nectria galligena</i>)	Pintar con PODASTIK® PLUS la madera después de removido el cancro.	La curación y aplicación de pintura debe realizarse en los meses de invierno. Una aplicación por temporada.
Paltos y Cítricos (limoneros, naranjos, mandarinos, Clementinas, Pomelos, Clemenules) Frutales Menores: (Arándanos, Frambuesos, Grosellos, Moras, Cranberry) Árboles Forestales (Pino Insigne, Pino Poderosa, Pino Oregon, Eucaliptus Nitens, Grandis, Globulus, Araucaria, Coihue, Mafío, Lingue, Roble) y Ornamentales (Clavel, Crisantemo, Rosal, Plantas de Interior) y sus viveros.	Hongos de la madera: Plateado: (<i>Chondrostereum purpureum</i>); Pudrición del cuello o pudrición del pie (<i>Phytophthora nicotianae</i>)	Pintar con PODASTIK® PLUS los cortes de poda o heridas.	PODASTIK® PLUS se debe aplicar inmediatamente después de efectuado el corte. Una aplicación por temporada, luego del corte.

APLICACIÓN: Preparación de la mezcla: Antes de usar, revuelva hasta homogeneizar la pasta. No es necesario preparar la mezcla. El producto viene listo para pintar los cortes de poda o heridas, no es necesario diluir.
COMPATIBILIDAD: **PODASTIK® PLUS** es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.
INCOMPATIBILIDAD: **PODASTIK® PLUS** es incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina y aceites minerales. Por su formulación no es necesario mezclarlo con otros pesticidas.
FITOTOXICIDAD: Siguiendo nuestras instrucciones de uso, **PODASTIK® PLUS** no es fitotóxico.
PERIODO DE CARENANCIA: No tiene carencias, no corresponde.
TIEMPO DE REINGRESO: No hay restricciones de reingreso al área tratada para personas ni animales, por corresponder a una pintura de poda.
© **PODASTIK** es Marca Registrada de **Arysta LifeScience Chile S.A.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clorotalonilo, ingrediente activo de **PODASTIK® PLUS**, pertenece al grupo químico de los cloronitrilos. Se debe evitar su inhalación, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la Preparación, del producto utilice guantes, protector facial y delantal. Durante su aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes, botas, protector facial y delantal. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Se debe eliminar el envase vacío lejos de un punto de agua, en un lugar aprobado por la autoridad competente. No verter en ríos, lagos o lagunas por ser tóxico a los peces. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Los síntomas de intoxicación pueden ser cefalea, somnolencia, vértigo, irritación, disnea, náuseas y vómitos.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión hacer dilución y lavado gástrico con suero salino, luego administrar absorbente 5 grs. de carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 grs. de Sulfato de Sodio en 500 cc. de agua usado como laxante. Llame inmediatamente a un médico. En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua de la llave la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Consulte a un médico. En caso de contacto con los ojos: si el afectado utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. Consulte a un médico. En caso de inhalación retire al paciente al aire libre. En caso de vómito espontáneo, despejar el tracto respiratorio. No suministrar sustancias vía oral a persona inconsciente. Eliminar las ropas contaminadas. Llame a un médico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.
ECOTOXICIDAD: **PODASTIK® PLUS** es tóxico a los peces, inocuo a las abejas y prácticamente no tóxico para aves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

TRIPLE LAVADO DE ENVASES:
Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono 2 26353800. Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA - CHILE: 2 27771994. El fono del distribuidor es: 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR:
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda la responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

Lote N°
Fecha Vencimiento:

Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile
ET2536V-009-3.8
OS1

PODASTIK® PLUS

**FUNGICIDA - PASTA
PA**

PODASTIK® PLUS es un fungicida de acción fungistática, y se utiliza para el control preventivo de enfermedades causadas por hongos de la madera en los cultivos indicados en el Cuadro de instrucciones de uso. Estos hongos se caracterizan por penetrar a través de heridas y/o cortes de poda. Al pintar los cortes con **PODASTIK® PLUS** se evita la entrada de los hongos *Chondrostereum purpureum*, agente causal del plateado en Carozos: Durazneros, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Nectarinos, Almendros, Plumcots y Pomáceas: Manzanos, Peral y Peral Asiático, además de Vides y Kiwis. Así mismo con aplicaciones tópicas se previene el ataque de los hongos causantes del enrollamiento clorótico de la Vid (Uva de Mesa, Parronales y Viñas) y del Cancro Europeo del Manzano, tal como se indica en el Cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Clorotalonilo 5 % p/v (50 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 L)
* Tetracloroisofaltonitrilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto Aprox.: 3,8 Lt.

Autorización del
Servicio Agrícola y
Ganadero N° 2.536

Fabrica:
Industrias Ceresitas S.A.
Lo Echevers 801, Quilicura,
Santiago, Chile.
Futec S.A.
Celia Solar 229,
Santiago, Chile



CUIDADO



PANTONE 347 C

NEGRO 100%

52 cm

16 cm

2,4 cm