

ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PLANTAS, ESTACAS Y RAMILLAS DE AVELLANO EUROPEO (*Corylus avellana*), CAQUI (*Diospyros kaki*), HIGUERA (*Ficus carica*), CEREZO MONGOL (*Prunus fruticosa*), CEREZO JAPONÉS (*Prunus serrulata*) Y ENDRINO (*Prunus spinosa*), PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA.

SANTIAGO,

N° _____ / VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el Decreto Ley N° 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola; el Decreto del Ministerio de Agricultura N° 156 de 1998 que habilita puertos para la importación de vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios, al territorio nacional; el Decreto N° 28 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores que aprueba el Acuerdo de Asociación entre Chile, la Comunidad Europea y sus Estados Miembros; las Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero N°s 558 de 1999; 3.280 de 1999; 1.523 de 2001; 2.863 de 2001; 3.080 de 2003; 3.815 de 2003; 2.878 de 2004; 133 de 2005; 3.589 de 2012; y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero está facultado para establecer los requisitos fitosanitarios para la importación al país de artículos reglamentados, a fin de prevenir la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.
2. Que el Servicio Agrícola y Ganadero ha recibido solicitudes de usuarios interesados para importar material de reproducción de las siguientes especies: avellano europeo (*Corylus avellana*), caqui (*Diospyros kaki*), higuera (*Ficus carica*), cerezo mongol (*Prunus fruticosa*), cerezo japonés (*Prunus serrulata*) y endrino (*Prunus spinosa*), procedentes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, especies sin requisitos fitosanitarios para su importación.
3. Que se ha realizado el Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias a los materiales de propagación de las siguientes especies, procedentes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea:
 - Plantas, estacas y ramillas de avellano europeo (*Corylus avellana*), caqui (*Diospyros kaki*), higuera (*Ficus carica*), cerezo mongol (*Prunus fruticosa*), cerezo japonés (*Prunus serrulata*) y endrino (*Prunus spinosa*).

RESUELVO

Establécense los siguientes requisitos fitosanitarios de importación para plantas, estacas y ramillas de las siguientes especies: avellano europeo (*Corylus avellana*), caqui (*Diospyros kaki*), higuera (*Ficus carica*), cerezo mongol (*Prunus fruticosa*), cerezo japonés (*Prunus serrulata*) y endrino (*Prunus spinosa*), procedentes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea:

1. El envío deberá venir amparado por un Certificado Fitosanitario oficial de la autoridad fitosanitaria del Estado Miembro de la Comunidad Europea correspondiente, en el que consten los siguientes requisitos y declaraciones adicionales:

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO / SAG

Dirección Nacional. Avenida Presidente Bulnes 140, piso 8. Santiago.

Fono: 2345 1101 / Fax: 2345 1102 / E-mail: dirnac@sag.gob.cl

Web: <http://www.sag.cl>

- 1.1. El material procede de un programa de producción bajo Certificación Oficial o de Viveros o Centros Repositorios de Germoplasma, que se encuentren bajo el control del Organismo Fitosanitario oficial del Estado Miembro de la Comunidad Europea.
- 1.2. Además, se debe indicar en el Certificado Fitosanitario las siguientes declaraciones adicionales, específicas para cada especie y tipo de material de reproducción que a continuación se señalan:

ESPECIE/TIPO MATERIAL DE REPRODUCCIÓN	DECLARACIÓN ADICIONAL
<p style="text-align: center;">AVELLANO EUROPEO (<i>Corylus avellana</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas en el momento óptimo y encontradas libres de <i>Monilinia fructigena</i>. ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas (especificar método de diagnóstico) en el momento óptimo para la detección de las plagas y encontradas libre de '<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>' (=Apple proliferation phytoplasma), '<i>Ca. Phytoplasma prunorum</i>' (=Apricot chlorotic leafroll phytoplasma), '<i>Ca. Phytoplasma pyri</i>' (=Pear decline phytoplasma) y <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>. ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Amphitetranychus viennensis</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Eotetranychus carpini</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Acleris rhombana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Acleris variegana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Adoxophyes orana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Archips</i> spp. (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Chionaspis salicis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Cnephasia longana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Hedya pruniana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Oberea linearis</i> (Col.: Cerambycidae). ✓ <i>Operophtera brumata</i> (Lep.: Geometridae). ✓ <i>Parlatoria oleae</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Phenacoccus aceris</i> (Hem.: Pseudococcidae). ✓ <i>Pulvinaria vitis</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Recurvaria nanella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Scolytus intricatus</i> (Col.: Curculionidae). ✓ <i>Spilonota ocellana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Zeuzera pyrina</i> (Lep.: Cossidae). ▪ El envío se encuentra libre de <i>Cecidophyopsis vermiformis</i> (Ac.: Eriophyidae), de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, según la técnica de diagnóstico de disección de yemas bajo microscopio binocular. ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que: 1) el envío se encuentra libre de <i>Otiorhynchus ovatus</i> y <i>O. singularis</i> (Col.: Curculionidae) y 2) se encuentra libre de <i>Paralongidorus maximus</i>, de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO / SAG

Dirección Nacional. Avenida Presidente Bulnes 140, piso 8. Santiago.

Fono: 2345 1101 / Fax: 2345 1102 / E-mail: dimac@sag.gob.cl

Web: <http://www.sag.cl>



<p style="text-align: center;">CAQUI (<i>Diospyros kaki</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Adoxophyes orana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Ceroplastes floridensis</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Ceroplastes japonicus</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Cossus cossus</i> (Lep.: Cossidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Parabemisia myricae</i> (Hem.: Aleyrodidae). ✓ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Synanthedon tipuliformis</i> (Lep.: Sesiidae). ✓ <i>Xylosandrus germanus</i> (Col.: Curculionidae). ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que se encuentran libres de <i>Xiphinema americanum</i> "sensu lato" (excepto poblaciones chilenas), de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.
<p style="text-align: center;">HIGUERA (<i>Ficus carica</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las plantas fueron inspeccionadas durante la última temporada de crecimiento y encontradas libres de <i>Cerotelium fici</i> y <i>Diaporthe (=Phomopsis) cinerescens</i>. ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas (especificar método de diagnóstico) en el momento óptimo para la detección de la plaga y encontradas libres de <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i>. ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ <i>Amphitetranychus viennensis</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Brevipalpus phoenicis</i> (Ac.: Tenuipalpidae). ✓ <i>Eutetranychus orientalis</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Aonidiella orientalis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Anoplophora chinensis</i> (Col.: Cerambycidae). ✓ <i>Aspidiotus destructor</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Ceroplastes floridensis</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Ceroplastes japonicus</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Ceroplastes rusci</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Nipaecoccus nipae</i> (Hem.: Pseudococcidae). ✓ <i>Zeuzera pyrina</i> (Lep.: Cossidae). ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que: 1) el envío se encuentra libre de <i>Phytophthora palmivora</i> y 2) se encuentra libre de <i>Heterodera fici</i> y <i>Meloidogyne hispanica</i>, de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.
<p style="text-align: center;">CEREZO MONGOL (<i>Prunus fruticosa</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas en el momento óptimo y encontradas libres de <i>Monilinia fructigena</i>. ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas (especificar método de diagnóstico para cada caso) en el momento óptimo para la detección de las plagas y encontradas libres de <i>Little cherry virus</i>, <i>Plum Pox virus</i> (PPV), '<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>' (=Apricot chlorotic leafroll



	<p>phytoplasma) y <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Anarsia lineatella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Archips</i> spp. (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cossus cossus</i> (Lep.: Cossidae). ✓ <i>Enarmonia formosana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Epiphyas postvittana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Hedya nubiferana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Leucoptera malifoliella</i> (Lep.: Lyonetiidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Operophtera brumata</i> (Lep.: Geometridae). ✓ <i>Pandemis heperana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Parlatoria oleae</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Recurvaria nanella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Spilonota ocellana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Synanthedon vespiformis</i> (Lep.: Sesiidae). ✓ <i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Col.: Curculionidae). ✓ <i>Xylosandrus germanus</i> (Col.: Curculionidae). ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que: 1) el envío se encuentra libre de <i>Capnodis tenebrionis</i> (Col.: Buprestidae) y 2) se encuentra libre de <i>Xiphinema americanum</i> "sensu lato" (excepto poblaciones chilenas), de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.
<p>CEREZO JAPONÉS (<i>Prunus serrulata</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas en el momento óptimo y encontradas libres de <i>Monilinia fructigena</i>. ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas (especificar método de diagnóstico para cada caso) en el momento óptimo para la detección de las plagas y encontradas libre de <i>Little cherry virus</i>, <i>Plum Pox virus</i> (PPV), '<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>' (=Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) y <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>. ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Amphitetranychus viennensis</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Anarsia lineatella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Anoplophora glabripennis</i> (Col.: Cerambycidae). ✓ <i>Archips</i> spp. (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cossus cossus</i> (Lep.: Cossidae). ✓ <i>Enarmonia formosana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Epiphyas postvittana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Hedya nubiferana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Myzus cerasi</i> (Hem.: Aphididae). ✓ <i>Operophtera brumata</i> (Lep.: Geometridae). ✓ <i>Pandemis heperana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Parlatoria oleae</i> (Hem.: Diaspididae).



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Recurvaria nanella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Spilonota ocellana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Taeniothrips inconsequens</i> (Thys.: Thripidae). ✓ <i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Col.: Curculionidae). ✓ <i>Xylosandrus germanus</i> (Col.: Curculionidae). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que: 1) el envío se encuentra libre de <i>Capnodis tenebrionis</i> (Col.: Buprestidae) y 2) se encuentra libre de los nematodos <i>Xiphinema americanum</i> "sensu lato" (excepto poblaciones chilenas) y <i>Xiphinema diversicaudatum</i>, de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.
<p style="text-align: center;">ENDRINO (<i>Prunus spinosa</i>)</p> <p>Plantas, Estacas o Ramillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas en el momento óptimo y encontradas libres de <i>Monilinia fructigena</i>. ▪ Las plantas derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas (especificar método de diagnóstico para cada caso) en el momento óptimo para la detección de las plagas y encontradas libre de <i>Little cherry virus</i>, <i>Plum Pox virus</i> (PPV), <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> (=Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) y <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>. ▪ El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de los siguientes artrópodos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Amphitetranychus viennensis</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Eotetranychus pruni</i> (Ac.: Tetranychidae). ✓ <i>Acleris cristana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Acleris variegana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Adoxophyes orana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Anarsia lineatella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Anoplophora glabripennis</i> (Col.: Cerambycidae). ✓ <i>Archips</i> spp. (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Cossus cossus</i> (Lep.: Cossidae). ✓ <i>Enarmonia formosana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Hedya</i> spp. (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Leucoptera malifoliella</i> (Lep.: Lyonetiidae). ✓ <i>Malacosoma neustria</i> (Lep.: Lasiocampidae). ✓ <i>Malacosoma pruinosa</i> (Lep.: Lasiocampidae). ✓ <i>Metcalfa pruinosa</i> (Hem.: Flatidae). ✓ <i>Operophtera brumata</i> (Lep.: Geometridae). ✓ <i>Pandemis heperana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Parlatoria oleae</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Phenacoccus aceris</i> (Hem.: Pseudococcidae). ✓ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Hem.: Diaspididae). ✓ <i>Recurvaria nanella</i> (Lep.: Gelechiidae). ✓ <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Hem.: Coccidae). ✓ <i>Spilonota ocellana</i> (Lep.: Tortricidae). ✓ <i>Synanthedon vespiformis</i> (Lep.: Sesiidae). ✓ <i>Taeniothrips inconsequens</i> (Thys.: Thripidae). ✓ <i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Col.: Curculionidae). ✓ <i>Zeuzera pyrna</i> (Lep.: Cossidae).



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El envío se encuentra libre de <i>Phytoptus similis</i> (Ac.: Eriophyidae), de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, según la técnica de diagnóstico de disección de yemas bajo microscopio binocular. ▪ Adicionalmente en envíos de plantas o estacas enraizadas, se debe indicar que: 1) el envío se encuentra libre de <i>Capnodis tenebrionis</i> (Col.: Buprestidae) y 2) se encuentra libre de <i>Xiphinema americanum</i> "sensu lato" (excepto poblaciones chilenas), de acuerdo a análisis oficial de laboratorio.
--	---

2. El material debe haber sido sometido a un tratamiento de desinfestación por inmersión contra insectos y ácaros, señalando en el Certificado Fitosanitario, en la sección correspondiente a tratamiento, el producto, tipo de aplicación y dosis utilizadas.
3. Adicionalmente, el envío deberá cumplir con los siguientes requisitos fitosanitarios que se verificarán en la inspección fitosanitaria en el puerto de ingreso:
 - Libre de suelo.
 - Libre de flores, hojas y restos de frutos.
 - Embalados en envases nuevos de primer uso, cerrados, resistentes a la manipulación, factibles de sellar y etiquetados o rotulados de acuerdo a la normativa vigente.
 - Los materiales de acondicionamiento destinados a amortiguar o conservar la humedad deben corresponder a materiales inertes, tales como turba, musgo esfángíneo, vermiculita, perlita o geles higroscópicos, de acuerdo a normativa vigente.
4. Cada partida será inspeccionada por el Servicio en el puerto de ingreso para la verificación física y documental de los requisitos fitosanitarios establecidos. Ante la detección de plagas cuarentenarias listadas en la Resolución N° 3.080 de 2003, o no listadas que sean caracterizadas como plagas cuarentenarias de acuerdo a un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), se evaluará la aplicación de medidas fitosanitarias de manejo de riesgo, acordes con el riesgo identificado.
5. La totalidad del material deberá cumplir con régimen de Cuarentena de Post-Entrada, instancia en que se realizarán los controles oficiales tendientes a la verificación de ausencia de Plagas Reglamentadas. Para tal efecto el importador deberá contar con la autorización del lugar de cuarentena la que debe ser presentada en el puerto de ingreso, al momento del arribo de la mercadería al país. Asimismo, deberá cumplir con las normativas vigentes del Servicio Agrícola y Ganadero que establecen regulaciones para material vegetal en régimen de cuarentena de post-entrada.
6. Si el material proviene de Centros Reconocidos Oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero, deberá cumplir con lo establecido en las normativas de este Servicio que regulan el reconocimiento de centros de producción para exportar material de propagación de especies vegetales a Chile, indicándose además, en la sección correspondiente del Certificado Fitosanitario la siguiente declaración adicional:

“El envío procede de (nombre del Centro), el cual ha sido Oficialmente reconocido hasta (fecha de vigencia) por Resolución N° (número de la Resolución de reconocimiento del Centro), de fecha (fecha)”.
7. Para los Materiales Modificados Genéticamente por Biotecnología Moderna, el importador deberá declarar su condición genética y cumplir con las normativas del Servicio Agrícola y Ganadero, que establecen los requisitos para la internación e introducción al medio ambiente de estos materiales.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO / SAG

Dirección Nacional. Avenida Presidente Bulnes 140, piso 8. Santiago.

Fono: 2345 1101 / Fax: 2345 1102 / E-mail: dimac@sag.gob.cl

Web: <http://www.sag.cl>



8. Los híbridos interespecíficos entre especies señaladas en la presente Resolución, deberán cumplir con todas las Declaraciones Adicionales establecidas para cada una de las especies que conforman el híbrido.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ANÍBAL ARIZTÍA REYES
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

SCD/SBF/FVF

DISTRIBUCION

Dirección Nacional

Direcciones Regionales SAG

División Jurídica

Unidad Normativa

Departamento de Clientes y Comunicaciones

División Protección Agrícola y Forestal

Oficina de Partes

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO / SAG

Dirección Nacional. Avenida Presidente Bulnes 140, piso 8. Santiago.

Fono: 2345 1101 / Fax: 2345 1102 / E-mail: dimac@sag.gob.cl

Web: <http://www.sag.cl>

