

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**Grupo Químico:** D-Limoneno pertenece al grupo químico de los Monoterpenos Monocíclicos.

**Durante la preparación del producto:** Tratar los envases cuidadosamente para evitar que se dañen. Trabajar con el material en áreas ventiladas. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla y antiparras. **Durante la aplicación:** Usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla y antiparras. Almacenaje: Almacenar en un lugar bajo llave, fresco, seco y ventilado.

**Síntomas de intoxicación:** El contacto con Protek puede producir irritación del tracto gastrointestinal, por lo cual debe efectuarse lavado gástrico. En algunos casos se presenta un hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece al poco tiempo.

**Primeros auxilios:** **Inhalación:** Trásele al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Si persisten las molestias por más de 10 minutos, consulte a un médico. **Ingestión:** No induzca el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. No se debe administrar leche o sustancias que contengan grasa. Busque atención médica inmediatamente. **Contacto con la Piel:** Quitar la ropa y calzado contaminado. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lave la ropa antes de volver a usarla. Si se observa irritación, busque asistencia médica. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, remóvalos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. **Tratamiento médico:** Simultáneo y de sostén. **Antídoto:** No tiene antídoto conocido.

**Ecotoxicidad:** Tóxico para organismos acuáticos y abejas. No tóxico para aves. **"NO APLICAR DURANTE LA FLOREACIÓN DE NINGUN CULTIVO, FRUTAL, MALEZA NI VEGETACIÓN COLINDANTE"; "TÓXICO PARA ABELAS. RETIRAR COLMEAS PREVIO A LA APLICACIÓN"; "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"; "ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO"; "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"; "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"; "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"; "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"; "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"; "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO DE REINGRESO INDICADO EN LA ETIQUETA";**

**Procedimiento de Triple Lavado:** Adicione agua limpia al envase hasta 1/4 de su capacidad, cierre el envase y agite durante 30 segundos, vacíe el enjuague en el tanque de aplicación y mantener el envase en posición de descarga por 30 segundos, repetir este procedimiento 3 veces. Envases deber ser perforados para evitar su reutilización.

**Teléfonos de Emergencia:** Rita-Chile: (2)26619414. ; Nutrien Ag Solutions Chile S.A.: (2)2447111

**Nota al comprador:** El importador garantiza la calidad y contenido señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas del uso, manipulación o almacenamiento.

# PROTEK®

INSECTICIDA – ACARICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Protek®** es un insecticida – acaricida de contacto de origen natural recomendado para el control en vides viníferas y de mesa de Chiranchillo blanco, Falsa araña roja, Conchuela negra del olivo y Trips de California. Control en tomate de Mosquilla blanca de los invernaderos y en Lechuga para el control de Pulgón de la lechuga, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones de Uso.

**COMPOSICIÓN**

Aceite de Toronja (Citrus x paradisii)\* ..... 22,3% p/v (223 g/L)  
 Aceite de Mandarina (Citrus x reticulata)\*\* ..... 14,9% p/v (149 g/L)  
 Coformulantes c.s.p. .... 100% p/v (11)  
 \* Equivalente a 20,07% p/v (200,7 g/L) de D-Limoneno (=R)-1-metil-4-(1-metilenil)-ciclohexeno)  
 \*\* Equivalente a 8,56% p/v (85,6 g/L) de D-Limoneno (=R)-1-metil-4-(1-metilenil)-ciclohexeno)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.688

**NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:  
**Química Sagal S.A.**, de CV,  
 Bosques Del Canada 110-9  
 Coloma Bosques Del Valle  
 C.P. 66250 Garza Garcia,  
 Monterrey  
 N.L. – México

Importado y distribuido por:  
**Nutrien Ag Solutions Chile S.A.**,  
 Av. Apoquindo 4700, of. 502  
 Las Condes Santiago  
 Chile



®- Marca Registrada de Química Sagal S.A. de CV.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**Protek®** es un insecticida – acaricida de contacto de origen natural recomendado para el control en vides viníferas y de mesa de Chiranchillo blanco, Falsa araña roja, Conchuela negra del olivo y Trips de California. Control en tomate de Mosquilla blanca de los invernaderos y en Lechuga para el control de Pulgón de la lechuga, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones de Uso.

**Cuadro de Instrucciones de Uso:**

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Uva Vinitera y de Mesa	Chiranchillo blanco (Pseudococcus viburni; P. cembra; P. longispinus)	4 L/ha	Aplicar al inicio de la aparición de la plaga en los cultivos. Repetir la aplicación en caso de existir mayor presión de la plaga. N° máximo de aplicaciones: 3, repitiendo cada 21 días. Usar un volumen de agua de 1500 - 3000 L/ha.
	Falsa araña roja (Brevipalpus chilensis)		
	Conchuela negra del olivos (Saissetia oleae)		
	Trips de California (Frankliniella occidentalis)	400 cc/ 100 L agua	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, cubriendo muy bien el follaje. Realizar 2 aplicaciones a un intervalo de 7 días. Utilizar un volumen de agua de 1500 L/ha.
Tomate al aire libre e invernadero	Mosquilla blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum)	500- 750 cc/100 L agua	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, cubriendo muy bien el follaje. Repetir la aplicación en caso de existir mayor presión de la plaga. N° máximo de aplicaciones: 3, repitiendo cada 14 días. Usar un volumen de agua de 200 - 800 L/ha.
Lechuga	Pulgón de la lechuga (Mesorhiza nebulosus)	500 cc/100 L agua	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, cubriendo muy bien el follaje. Repetir la aplicación en caso de existir mayor presión de la plaga. N° máximo de aplicaciones: 3, repitiendo cada 10 días. Usar un volumen de agua de 500 L/ha.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estancque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua deseado, luego incorporar la cantidad de **Protek®** requerida y completar con agua hasta el volumen final.

**Métodos de Aplicación:** Con equipos de nebulización convencionales para la aplicación de plaguicidas.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico si es usado según las recomendaciones de uso.

**Incompatibilidad:** Incompatible con fertilizantes o micronutrientes. Realice una prueba de compatibilidad antes de proceder a mezclar con otro producto.

**Compatibilidad:** Puede combinarse con otros plaguicidas de uso común. Realice una prueba de compatibilidad antes de proceder a mezclar con otro producto.

**Tiempo de Reingreso:** Las personas y animales podrán reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación.

**Periodo de Carenacia:** Este producto puede aplicarse hasta el día de la cosecha, por ser un producto 100% natural y biodegradable.



**CUIDADO**

